

二型糖尿病辅助配方

常见症状

1. 喝水多,吃的多,尿的多,不明原因的体重下降,
2. 乏力,极易激怒
3. 经常感染,视力模糊,
4. 伤口不易愈合,
5. 手脚常有刺痛或麻木感,
6. 皮肤,牙床和膀胱反复发炎.

注意: 很多二型糖尿病人可以很多年没有任何症状

建议使用

1. Transition 生活方式 和控制饮食---减少糖和碳水化合物的进食,多吃新鲜蔬菜水果,
2. 碧螺芷松葡精(OPC-3—90 天)--- 稳定血糖,保护视力,改善血液微循环,降低炎症
3. 等渗多维(Isotonix Multivitamin-- 90 天)--- 增加营养,促进糖原合成,促进蛋白质新陈代谢
4. 稳定血糖保护剂(Advanced Level90--30 天)--- 减慢胃排空,降低嗜糖欲,控制体重,
5. 等渗消化酶+益生菌(Isotonix Digestive Enzyme with Probiotics—袋装 20)--- 维持正常胆固醇水平,促进营养吸收,加快毒素排除,
6. 等渗铬(Isotonix Isochrome-- 30 天)--- 提高身体对胰岛素的敏感性,有助心血管的健康,

用法

1. Transition 生活方式 和控制饮食
2. 碧螺芷松葡精(OPC-3—90 天)--- 早上空腹 1 或 2 盖
3. 等渗多维(Isotonix Multivitamin-- 90 天)--- 早上空腹 1 盖
4. 稳定血糖保护剂(Advanced Level90--30 天)--- 每次进餐时一片外加一杯水(8 盎司)
5. 等渗消化酶+益生菌(Isotonix Digestive Enzyme with Probiotics—袋装 20)--- 每餐后半袋
6. 等渗铬(Isotonix Isochrome-- 30 天)--- 餐前 1 盖,一天一次